

GUÍA CLÍNICA DE TRIAJE TELEFÓNICO

Para Demandas Asistenciales por **PARTO Y ALUMBRAMIENTO DE URGENCIAS**

TD: A46

Versión_0

Revisión consensuada PAUE

4 de Octubre de 2010

PREGUNTAS:

1. ¿Tiene contracciones?

- a) no
- b) sí

2. ¿Con que frecuencia las tiene?

- a) Más de 5 minutos
- b) Menos de 5 minutos

3. ¿Desde cuándo tiene las contracciones?

- a) Menos de 45 minutos en primíparas
- b) Menos de 45 minutos en multíparas
- c) Más de 45 minutos

4. ¿Sangra?

- a) Como una regla
- b) Más cantidad que una regla

******* Si no saltó ninguna alarma, solicite ESCUCHA al Coordinador**

5. ¿de cuánto tiempo está embarazada?

- a) Embarazo < de 37 semanas
- b) Embarazo > de 37 semanas



6. ¿Ha roto la bolsa?

- a) Sí, ha roto la bolsa
- b) No, no ha roto la bolsa

CONSEJOS:

- Tranquilizar a la parturienta
- Tumbarla sobre cama o material blando, con piernas abiertas.
- Colocar bajo las nalgas sábanas o toallas
- Indicar que respire tranquila con la boca abierta sin empujar
- No aprieten el abdomen
- No tiren del niño, sostener la cabeza y el cuerpo mientras sale.
- Limpien la boca y nariz de secreciones.
- Si no respira hagan boca a boca-nariz y sople suavemente.
- A unos 10 cm del ombligo haga 2 ligaduras con hilo.
- No tiren del cordón.
- Arropen al niño y colóquenlo junto a la madre