

PROTOCOLO DE VALORACIÓN TELEFÓNICA:

Para demandas asistenciales de pacientes en cuidados paliativos con

FIEBRE Adulto para Pacientes en Cuidados Paliativos. A5006a

Fecha Modificación: **Marzo 2018**

PUERTA DE ENTRADA

Se accederá a este protocolo ante demandas de pacientes que manifiesten tener fiebre, calentura o aumento de la temperatura corporal por encima de los límites de la normalidad.

PREGUNTAS:

1. ¿Que temperatura tiene?

- a) NO le han puesto el termómetro
- b) < 38,5°
- c) Entre 38,5° y 40°C
- d) > 40°C

2. ¿Le ha bajado la fiebre con el antitérmico?

- a) Sí
- b) No
- c) No le han dado nada.

3. Le han administrado algún tratamiento recientemente:

- a) Quimioterapia en las últimas 2 semanas
- b) Transfusión de hematíes o plaquetas en últimas 48h
- c) Corticoides
- d) Otros (anotar en medidas)

4. ¿Es portador de algún dispositivo?

- a) Dispositivo venoso para la administración de tratamiento
- b) Válvula de derivación cerebral.
- c) Sonda urinaria
- d) Sonda Nasogástrica.
- e) Ostomía.
- f) Otros.



5. ¿Le nota otra cosa o se queja de algo?

- a) Dificultad respiratoria y/o Dolor en el costado
- b) Bajo nivel de consciencia.
- c) Aparición brusca de manchas en la piel
- d) Molestias de garganta, de nariz o de oídos
- e) Dolor abdominal
- f) Diarrea/Vómitos
- g) Molestias al orinar o alteraciones de la orina
- h) Estreñimiento.
- i) No presenta otra cosa ni se queja de nada

*** Si no intervino el médico ni saltó una alarma:

Solicite ESCUCHA al Coordinador Sanitario de Enfermería o, en su defecto, al Coordinador Médico.

En caso de coordinador no disponible y sin ninguna alarma activa la demanda adquirirá prioridad 3 y se procederá a activar el recurso que establezca el PODUE.

Reglas

Estas demandas parten de **Prioridad 3** por defecto.

- Alertas de **Prioridad 1:**

Regla 1: **1d+5b** >40°C + Bajo nivel de consciencia.

Regla 2: **1d+5c** >40°C + Aparición brusca de manchas en la piel.

Possible **EMERGENCIA**, active rápidamente **Equipo de Emergencia 061 / EM** según PODUE o **ECA** en caso de saturación, o en su defecto el Recurso de Soporte Vital Avanzado que corresponda (**TSC, SUAP**, etc.)

- Alertas de **Prioridad 2:**

Regla 3: **1d+5a** >40°C + Dificultad para respirar.

Regla 4: **1d+4a** >40°C + Dispositivo venoso para la administración de tratamiento.

Regla 5: **1d+4b** >40°C + Válvula de derivación.

Regla 6: **1d+4c** >40°C + Sonda Urinaria.

Regla 7: **1c+4a** 38,5°-40°C + Dispositivo venoso.



Regla 8: **1c+4b** 38,5°-40°C + Válvula de derivación.

Regla 9: **1c+4c** 38,5°-40°C + Sonda Urinaria.

Regla 10: **1c+5a** 38,5°-40°C + Dificultad para respirar.

Activar Recurso **EM** según Plan Operativo y solicitar Requerimiento (Intercomunicación) al Coordinador

- Alertas de **Prioridad 3:**

Resto de combinaciones

Mensaje de alerta:

Esta demanda ha alcanzado Prioridad 3

Solicite ESCUCHA al Coordinador Sanitario de Enfermería o, en su defecto, al Coordinador Médico.

En caso de coordinador no disponible y si no saltó una alarma activar el Recurso que establezca el Plan Operativo

CONSEJOS

- Si no lo ha hecho, póngale el termómetro
- No abrigarlo
- Airear la habitación (mantener Tª ambiental entre 20 y 22°C)
- Beber abundantes líquidos frescos.
- Sí fiebre muy alta: compresas de agua fría o baños de agua tibia durante 30 minutos
- No dar friegas con soluciones alcohólicas.
- Vigile al paciente
- No dar metamizol (Nolotil®), ya que se deja para uso hospitalario.
- En niños: evitar la alternancia entre dos fármacos antitérmicos, como el paracetamol e ibuprofeno