



GUÍA CLÍNICA DE TRIAJE TELEFÓNICO para las Demandas por **INCONSCIENTE / SOSPECHA DE PCR A5802 en NIÑOS**

TD: A3602 A5802

Versión_0

Aprobada: Junio de 2013

PREGUNTAS:

1. ¿Puede hablar o emitir sonidos?

- a) SI
- b) NO

2. ¿Abre los ojos y/o dirige la mirada?

- a) SI
- b) NO

3. ¿Cómo respira?

- a) Respira con normalidad
- b) Respira con dificultad/ Ruidos al respirar/ Ronquidos
- d) No respira

4. Esto es muy importante: si está cerca del paciente, acérquese, estimúlelo (pellízquelo, zarandéele) y vea cómo reacciona

- a) Está reaccionando
- b) Sigue sin reaccionar

****** Si no saltó una alarma ni intervino el médico, solicite una ESCUCHA.**

5. ¿Padece de alguna enfermedad?

- a) No padece de nada
- b) Del corazón
- c) Problemas respiratorios
- d) Diabetes
- e) Fiebre
- f) Otras (anotar en medidas)

6. ¿Cuánto tiempo lleva así?

- a) Anotar en medidas

7. ¿Le ha pasado esto alguna vez?

- a) SI
- b) NO



CONSEJOS:

¿Responde? ¿Respira con normalidad?

1. NO RESPONDE Y RESPIRA: **Posición Lateral de Seguridad**

- a) Coloque de lado (salvo en traumatizados)
- b) No intente darle medicamentos ni líquidos.
- c) No lo deje solo y obsérvelo constantemente
- d) Aflójele la ropa que le oprima.

2. NO RESPONDE Y NO RESPIRA, ó no respira con normalidad (boqueadas o jadeos entrecortados): **Iniciar RCP**

La ambulancia con el médico ya va para el lugar.

Ahora vamos a ayudarlo, escuche con atención, si tiene el teléfono altavoz póngalo.

Preguntar la edad aproximada para recomendar donde dar el masaje:

Niños < 1 año:

- a) La zona de compresión será en el centro del pecho.
- b) Con dos dedos: se colocarán los dedos medio y anular en el tercio inferior del esternón.
- c) Con la punta de los dedos se debe hundir el pecho unos 3 cm

Niños entre 1 y 8 años:

- El masaje se puede realizar con el talón de una mano apoyado en el centro del pecho, comprimirá para que el pecho baje unos 4 cm.

Niños > 8 años:

- Con las dos manos entrelazadas como en el adulto, comprimir de 4-5 cm.

¿Alguien sabe hacer reanimación?

SI: (recordar con la persona....)

- a) **De 5 respiraciones**, abra la vía aérea, tapándole la nariz y cubriendo su boca con la suya.
- b) Cada 30 compresiones, realice 2 ventilaciones de 1 seg.
Solo en el caso de dos personas con el niño que sepan hacer RCP se recomendará 2 ventilaciones cada 15 compresiones.
- c) Si dispone de desfibrilador cercano, conectar y seguir las instrucciones
- d) Si tiene problemas al ventilar, mantener las compresiones a ritmo de 100 por minuto
- e) Comenzamos a contar 1, 2, 3... como en las películas...debemos hacer unas 100 por minuto.
- f) ¿Hay alguien con Ud. que le pueda ayudar? ...**SI: relevar cada dos minutos.**
- g) Animar periódicamente:
"Lo esta haciendo muy bien...No lo deje...continúe hasta que llegue nuestro equipo. Le puede salvar la vida"
- h) Cuando llegue el recurso, felicitar siempre al llamante y agradecer su colaboración.

NO:

- a) **De 5 respiraciones**, eche la cabeza hacia atrás, con la barbilla apuntando al techo.
- b) Tape la nariz del niño y cubra la boca del niño con la suya, sople suavemente durante 1 seg. para que el pecho del niño se levante.
- c) Cada **30 compresiones**, realice **2 ventilaciones de 1 seg.** Si tiene problemas al ventilar, mantener compresiones a ritmo de 100 por minuto.



- d) Comenzamos a contar 1, 2, 3.... como en las películas...debemos hacer unas 100 por minuto.
- e) ¿Hay alguien con Ud. que le pueda ayudar? ...**Si: relevar cada dos minutos.**
- f) Animar periódicamente:
"Lo esta haciendo muy bien...No lo deje...continúe hasta que llegue nuestro equipo. Le puede salvar la vida"
- g) Cuando llegue el recurso, felicitar siempre al llamante y agradecer su colaboración.

NOTA: siempre que no dificulte la reanimación recordar que se facilite la llegada del EE al escenario:

- **Lugares públicos:** (Avisar a seguridad, porteros, empleados del espacio publico etc....)

- **Domicilios:**

- Alguien en el portal con la puerta abierta, bloquear el ascensor para el uso del equipo de emergencias.
- Retirar si puede, los muebles y objetos de alrededor (despejar el lugar)

REGLAS:

Regla 1:	1 a	Habla o emite sonidos
Regla 2:	2 a + 3 a	abre los ojos + respira con normalidad
Regla 3:	1 b + 2 b + 3 b	no habla ni emite sonidos + no abre los ojos + respira con dificultad o ruidos respiratorios
Regla 4:	3 c	no respira
Regla 5:	4 b	sigue sin reaccionar
Regla 6:	4 a	está reaccionando

Las reglas **1, 2, 6** generan un mensaje de "Solicite ESCUCHA al Médico Coordinador".

Regla Tipo **M**

Mensaje:

Solicite ESCUCHA al Médico Coordinador para la valoración de esta Demanda.

Las reglas **3, 4 y 5** generan un cambio de Prioridad 1 en la Demanda y la presentación del mensaje específico "**Posible EMERGENCIA, active rápidamente Equipo de Emergencia 061 o ECA si está más próximo (activando simultáneamente el EE), o en su defecto el Recurso de Soporte Vital Avanzado que corresponda (DCCU, TSC, etc.)**".

Mensaje específico para Prioridades 1:

Posible **EMERGENCIA**, active rápidamente:

- **Equipo de Emergencia 061 o ECA si está más próximo (activando simultáneamente el EE) o, en caso de saturación**
- **El Recurso de Soporte Vital Avanzado que corresponda (DCCU, TSC, etc.)**

